

畦畔除草特集

平成27年6月 日
白山石川営農推進協議会
石川県農業共済組合
松任市農業協同組合

～ 畦畔、農道、雑草地等の草刈りを徹底し、カメムシの生息地をなくしましょう！～

☆水稲畦畔等の除草

区分	薬剤名	使用時期	10a 当たり使用量			使用回数
			薬量		希釈水量	
			1年生雑草	多年生雑草		
水田 畦畔 (水稲)	ラウンドアップマックスロード	雑草生育期 (収穫前日まで)	200～500ml	200～1000ml	通常散布 50～100L 少量散布 25～50L	※ 2回以内
	サンフーロン液剤	雑草生育期 (草丈 30cm 以下、収穫 14 日前まで)	250～500ml	500～1000ml	50～100L	
	バスタ液剤	雑草生育期 (草丈 30cm 以下、収穫 7 日前まで)	500～1000ml		100～150L	※ 2回以内
	ザクサ液剤	雑草生育期 (草丈 30cm 以下、収穫 7 日前まで)	500～1000mL		100～150L	
	プリグロックスL	雑草生育期	600～1000ml	1000～2000ml	100～150L	5回以内
	2, 4-Dアミン塩	雑草生育期 (草丈 30cm 以下、収穫 30 日前まで)	100g		100L	3回以内
	MCPソーダ塩	雑草生育期 (草丈 30cm 以下、収穫 14 日前まで)	200～400g		100L	3回以内
農道	ラウンドアップマックスロード	雑草生育期	200～500ml	500～1000ml	通常散布 50～100L 少量散布 25～50L	3回以内
	サンフーロン液剤	雑草生育期 (草丈 30cm 以下)	500ml	1000ml	100L	3回以内
	バスタ液剤	雑草生育期	500～1000ml	1000～2000ml	100～200L	3回以内
	プリグロックスL	雑草生育期	800～1000ml	1500～2000ml	100～150L	3回以内
	カソロン粒剤6. 7	雑草発生前～発生始期	6～9kg	10～15kg	—	3回以内

※ラウンドアップマックスロード、サンフーロンは同じ成分を含んでいます。水田畦畔で使用する場合は、合わせて2回までしか使用できません。

※バスタ液剤、ザクサ液剤は同じ成分を含んでいます。水田畦畔で使用する場合は、合わせて2回までしか使用できません。

★大豆畦畔の除草 ～ 大豆畦畔も、7月上旬までに除草を済ませましょう！～

- ①大豆田と大豆田の間にある畦畔は、「だいず」に登録のある除草剤を使用して下さい。
- ②大豆田と水田の間にある畦畔は、「だいず」または「水田畦畔」のいずれかに登録のある除草剤を使用できます。
- ③「水田畦畔」で登録されている除草剤の2, 4-D、サンフーロン液剤は、大豆には使用できません。
- ④農薬散布の際、風向き等に注意するなど、適用のない作物に農薬が飛散しないよう、十分に注意して散布しましょう。

区分	除草剤名	適用雑草名	使用時期	10a 使用量 (希釈水量)	使用方法	使用回数
だ い ず	ナブ乳剤	一年生イネ科雑草 (<i>スズメノカタビラ</i> を除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 〔収穫 30 日前まで〕	150～200ml (100～150L)	雑 草 茎 葉 散 布	1回
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 〔収穫 30 日前まで〕	200ml (100L)		
	ポルトフロアブル	一年生イネ科雑草 (<i>スズメノカタビラ</i> を除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～10 葉期 〔収穫 30 日前まで〕	200～300ml (100L)		1回
	大豆バサグラン液剤	一年生雑草 (イネ科を除く)	大豆の2葉期～開花前 雑草生育初期～6葉期〔収穫 45 日前まで〕	100～150ml (100L)		1回
	バスタ液剤	一年生雑草	雑草生育期 (雑草草丈 20 cm 以下) 畦間処理 〔収穫 28 日前まで〕	300～500ml (100～150L)		3回 以内
	プリグロックスL	一年生雑草	雑草生育期 (雑草草丈 30 cm 以下) 畦間処理 〔収穫 3 日前まで〕	600～1000ml (100～150L)		4回 以内
ラウンドアップマックスロード	一年生雑草	雑草生育期 畦間処理 〔収穫前日まで〕	200～500ml (50～100L)	2回 以内		

※【非選択性】のバスタ液剤などは、大豆にかかると枯れてしまうため、畦畔散布の際、注意して下さい。

※バスタ液剤、プリグロックスL、ラウンドアップマックスロードについては、畦畔での使用回数も含まれますので注意して下さい。